



### Lastenneuvolakäyntien perusrunko

2–3 vk	Terveydenhoitaja
5–6 vk	Lääkäri ja terveydenhoitaja + rokotus (Rota 6 vk täyttäneille)
2 kk	Terveydenhoitajan neuvolakäynti Perhetyöntekijän kotikäynti ensisynnyttäjille
3 kk	Terveydenhoitaja + rokotus (Rota, PCV, DTaP-IPV-Hib)
4 kk	Lääkäri ja terveydenhoitaja
5 kk	Terveydenhoitaja + rokotus (Rota, PCV, DTaP-IPV-Hib)
6 kk	Terveydenhoitaja + rokotus (Influenssarokotus*)
8 kk	Lääkäri ja terveydenhoitaja
(10 kk)	(Terveydenhoitaja tarvittaessa)
12 kk	Terveydenhoitaja + rokotus (PCV, DTaP-IPV-Hib, MPR) Raskausdiabetesseuranta äidillä: ○ paino, pituus, BMI, vyötärömitta, RR, sokerirasituskoet, veren rasvat ○ tupakka, alkoholi
1 v 6 kk	Lääkäri ja terveydenhoitaja (vesirokkorokotus)
2 vuotta	Terveydenhoitaja S-Kol-seula lapselle, mikäli vanhemmilla tai lähisuvussa sydän- ja verisuonisairauksia
3 vuotta	Terveydenhoitaja
4 vuotta	Lääkäri ja terveydenhoitaja + rokotus (DTaP-IPV) Raskausdiabetesseuranta äidillä: ○ paino, pituus, BMI, vyötärömitta, RR, sokerirasituskoet ○ tupakka, alkoholi
5 vuotta	Terveydenhoitaja

#### Käytetyt rokotuslyhenteet:

Rota = Rotavirusrokote DTaP-IPV-Hib = Kurkkumätä, jäykkäkouristus, hinkuyskä, polio, Haemophilus influenzae tyyppi B -infektiot DTaP-IPV = Kurkkumätä, jäykkäkouristus, hinkuyskä, polio MPR = Tuhkarokko, vihurirokko, sikotauti PCV = Pneumokokkirokote \*Influenssarokotus syksyllä, 6kk-6v ikäisille lapsille ja lääketieteellisille riskiryhmille